

*Após um risco de transmissão do HIV,
mostre esse papel ao pessoal médico*

URGENCE MÉDICALE


À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D'URGENCE :



*Dans les dernières 48 heures, j'ai eu
un risque de transmission du VIH
avec une personne dont je ne connais
pas le statut sérologique.*

*Pour prévenir ce risque de transmission
du VIH, je souhaite bénéficier
d'un traitement antirétroviral.*

*Merci de bien vouloir me prendre
en charge.*



PARA CONHECER ONDE IR, CONSULTE :

 **Sida Info Service.org**
0 800 840 800
Chamada confidencial, anônimo e gratuito



Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier
de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité
des Médicaments), dans le cadre d'un appel
à projets compétitifs.

**Você acha colocara
seu corpo em risco
de contrair o HIV...**



**...NÃO ENTRE
EM PÂNICO!
Existe uma solução.**

O TPE

TRATAMENTO PÓS ESPOSIÇÃO

▶ É O QUÊ ?



É um tratamento acessível após um risco de transmissão do HIV para evitar de ser contaminado(a).

Você tem 48h para começar a tomar o TPE, mas quanto mais cedo melhor.



Em seguida, o TPE dura **28 dias** com um acompanhamento no hospital.

▶ COMO OBTÊ-LO ?



24h/24, 7d/7 no serviço de emergências.

Você pode também ir em um CeGIDD (centro de triagem) em função dos horários de abertura.

ALGUNS CONSELHOS PARA FAZER AS COISAS BEM ;)

Para que o TPE seja eficaz, é preciso tomá-lo **todos os dias durante 28 dias**, mesmo se o resultado do primeiro exame de sangue é negativo.



Coloque um alarme diário no seu celular!



É importante de **ir todas as consultas de acompanhamento pelo hospital**, para fazer testes para que o médico verifique que o seu fígado e os seus rins suportam bem o tratamento. Ele o adaptará se necessário.



Se você sentir fadiga, náusea ou outras coisas, **não pare o tratamento**. Existe soluções para evitar os efeitos indesejáveis. Consulte o serviço que te prescreveu o tratamento, eles poderam te ajudar.



Se um(a) amigo(a) te deu medicamentos após ter tomado um risco, é, de toda maneira, importante de ir ao hospital para fazer um acompanhamento médico.

Se possível, levar os medicamentos que você tomou, a caixa ou uma foto dos comprimidos.

Os medicamentos prescritos para o TPE variam segundo se você estiver grávida ou se você já faz um outro tratamento.

Nunca faça um tratamento sem opinião médica.

Se você não tem uma contracepção, não esqueça de tomar a pílula do dia seguinte (Lévonorgestrel) para **evitar uma gravidez**.